arXiv:1403.7809v1 [math-ph] 30 Mar 2014

Модель Поттса с тремья состояниями на дереве Кэли: периодические меры Гиббса

Р.М.Хакимов

В работе [1] изучена ферромагнитная модель Поттса с тремя состояниями на дереве Кэли второго порядка и показано существование критической температуры T_c такой, что при $T < T_c$ существуют три трансляционно-инвариантных и несчетное число не трансляционно-инвариантных мер Гиббса. В работе [2] обобщены результаты работы [1] для модели Поттса с конечным числом состояний на дереве Кэли произвольного (конечного) порядка.

Кроме того, показано, что на дереве Кэли трансляционно-инвариантная мера Гиббса антиферромагнитной модели Поттса с внешним полем единственна (см. [3]). Работа [4] посвящена модели Поттса со счетным числом состояний и с ненулевым внешним полем и доказано, что эта модель имеет единственную трансляционно-инвариантную меру Гиббса.

В работе [5] при некоторых условиях доказано, что все периодические меры Гиббса являются трансляционно-инвариантными; найдены условия, при которых модель Поттса с ненулевым внешним полем имеет периодические меры Гиббса. В недавной работе [6] дано полное описание трансляционно-инвариантных мер Гиббса для ферромагнитной модели Поттса с q состояниями и показано, что их количество не больше $2^q - 1$.

В этой работе мы покажем, что при некоторых условиях на параметр модели Поттса с тремья состояниями с нулевым внешним полем на дереве Кэли порядка $k \geq 3$ существуют не менее двух периодических (не трансляционно-инвариатных) мер Гиббса.

Дерево Кэли $\Im^k$ порядка $k \geq 1$ - бесконечное дерево, т.е. граф без циклов, из каждой вершины которого выходит ровно $k+1$ ребер. Пусть $\Im^k = (V, L, i)$, где V — есть множество вершин $\Im^k$, L — его множество ребер, и i — функция инцидентности, сопоставляющая каждому ребру $l \in L$ его концевые точки $x, y \in V$. Если $i(l) = \{x, y\}$, то x и y называются *ближайшими соседями вершины* и обозначается $l =< x, y >$. Расстояние $d(x, y), x, y \in V$ на дереве Кэли определяется формулой

$$d(x,y) = \min \{d | \exists x = x_0, x_1, \ldots, x_{d-1}, x_d = y \in V \ \text{ такой, что } \ < x_0, x_1 >, \ldots, < x_{d-1}, x_d >\}.$$

Для фиксированого $x^0 \in V$ обозначим $W_n = \ \{x \in V \ \mid \ d(x, x^0) = n\}$,

$$V_n = \ \{x \in V \ \mid \ d(x, x^0) \leq n\}, \ \ L_n = \ \{l =< x, y >\in L \ \mid \ x, y \in V_n\}. \tag{1}$$

Известно, что существует взаимнооднозначное соответствие между множеством V вершин дерева Кэли порядка $k \geq 1$ и группой G_k, являющейся свободным произведением $k+1$ циклических групп второго порядка с образующими $a_1, a_2, \ldots, a_{k+1}$, соответсвенно.

Мы рассмотрим модель, где спиновые переменные принимают значения из множества $\Phi = \ \{1, 2, \ldots, q\}$, $q \geq 2$ и расположены на вершинах дерева. Тогда *конфигурация* σ на V определяется как функция $x \in V \to \sigma(x) \in \Phi$; множество всех конфигураций совпадает с $\Omega = \Phi^V$.

Гамильтониан модели Поттса определяется как

$$H(\sigma) = -J \sum_{\langle x,y \rangle \in L} \delta_{\sigma(x)\sigma(y)}, \tag{2}$$

где $J \in R$, $\langle x, y\rangle-$ ближайшие соседи и $\delta_{ij}-$ символ Кронекера:

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{если } i \neq j \\ 1, & \text{если } i = j. \end{cases}$$

Определим конечномерное распределение вероятностной меры μ в обьеме V_n как

$$\mu_n(\sigma_n) = Z_n^{-1} \exp\left\{-\beta H_n(\sigma_n) + \sum_{x \in W_n} h_{\sigma(x),x}\right\}, \tag{3}$$

где $\beta = 1/T$, $T > 0$–температура, Z_n^{-1} нормирующий множитель и $\{h_x = (h_{1,x}, \ldots, h_{q,x}) \in R^q, x \in V\}$ совокупность векторов и

$$H_n(\sigma_n) = -J \sum_{\langle x,y\rangle \in L_n} \delta_{\sigma(x)\sigma(y)}.$$

Говорят, что вероятностное распределение (3) согласованное, если для всех $n \geq 1$ и $\sigma_{n-1} \in \Phi^{V_{n-1}}$:

$$\sum_{\omega_n \in \Phi^{W_n}} \mu_n(\sigma_{n-1} \vee \omega_n) = \mu_{n-1}(\sigma_{n-1}). \tag{4}$$

Здесь $\sigma_{n-1} \vee \omega_n$ есть объединение конфигураций. В этом случае, существует единственная мера μ на Φ^V такая, что для всех n и $\sigma_n \in \Phi^{V_n}$

$$\mu(\{\sigma|_{V_n} = \sigma_n\}) = \mu_n(\sigma_n).$$

Такая мера называется расщепленной гиббсовской мерой, соответсвующей гамильтониану (2) и векторзначной функции $h_x, x \in V$.

Следующее утверждение описывает условие на h_x, обеспечивающее согласованность $\mu_n(\sigma_n)$.

Теорема 1.[3] *Вероятностное распределение $\mu_n(\sigma_n)$, $n = 1, 2, \ldots$ в (3) является согласованной тогда и только тогда, когда для любого $x \in V$ имеет место следующее*

$$h_x = \sum_{y \in S(x)} F(h_y, \theta), \tag{5}$$

где $F : h = (h_1, \ldots, h_{q-1}) \in R^{q-1} \to F(h, \theta) = (F_1, \ldots, F_{q-1}) \in R^{q-1}$ определяется как:

$$F_i = \ln\left(\frac{(\theta-1)e^{h_i} + \sum_{j=1}^{q-1} e^{h_j} + 1}{\theta + \sum_{j=1}^{q-1} e^{h_j}}\right),$$

и $\theta = \exp(J\beta)$, $S(x)-$ множество прямых потомков точки x.

Пусть $\widehat{G}_k-$ подгруппа группы G_k.

Определение 1. Совокупность векторов $h = \{h_x,\, x \in G_k\}$ называется $\widehat{G}_k$-периодической, если $h_{yx} = h_x$ для $\forall x \in G_k, y \in \widehat{G}_k$.

G_k- периодические совокупности называются трансляционно-инвариантными.

Определение 2. Мера μ называется $\widehat{G}_k$-периодической, если она соответствует $\widehat{G}_k$-периодической совокупности векторов h.

Следующая теорема характеризует периодические меры Гиббса.

Теорема 2.[5] *Пусть $K-$ нормальный делитель конечного индекса в G_k. Тогда для модели Поттса все $K-$ периодические меры Гиббса являются либо $G_k^{(2)}-$ периодическими, либо трансляционно-инвариантными.*

Рассмотрим случай $q=3$, т.е. $\sigma: V \to \Phi = \{1,2,3\}$. В силу Теоремы 2 имеются только $G_k^{(2)}$-периодические меры Гиббса, которые соответствуют совокупности векторов $h = \{h_x \in R^{q-1} : x \in G_k\}$ вида

$$h_x = \begin{cases} h^1, & \text{если } |x| - \text{четно}, \\ h^2, & \text{если } |x| - \text{нечетно}. \end{cases}$$

Здесь $h^1 = (h_1^1, h_2^1)$, $h^2 = (h_1^2, h_2^2)$. Тогда в силу (5) имеем:

$$\begin{cases} h_1^1 = k \ln\left(\frac{\theta \exp(h_1^2)+\exp(h_2^2)+1}{\exp(h_1^2)+\exp(h_2^2)+\theta}\right) \\ h_2^1 = k \ln\left(\frac{\exp(h_1^2)+\theta \exp(h_2^2)+1}{\exp(h_1^2)+\exp(h_2^2)+\theta}\right) \\ h_1^2 = k \ln\left(\frac{\theta \exp(h_1^1)+\exp(h_2^1)+1}{\exp(h_1^1)+\exp(h_2^1)+\theta}\right) \\ h_2^2 = k \ln\left(\frac{\exp(h_1^1)+\theta \exp(h_2^1)+1}{\exp(h_1^1)+\exp(h_2^1)+\theta}\right). \end{cases}$$

Введем следующие обозначения: $\exp(h_1^1) = z_1,\ \exp(h_2^1) = z_2,\ \exp(h_1^2) = z_3,\ \exp(h_2^2) = z_4$. Тогда последнюю систему уравнений можно переписать:

$$\begin{cases} z_1 = \left(\frac{\theta z_3+z_4+1}{z_3+z_4+\theta}\right)^k \\ z_2 = \left(\frac{\theta z_4+z_3+1}{z_3+z_4+\theta}\right)^k \\ z_3 = \left(\frac{\theta z_1+z_2+1}{z_1+z_2+\theta}\right)^k \\ z_4 = \left(\frac{\theta z_2+z_1+1}{z_1+z_2+\theta}\right)^k. \end{cases} \tag{6}$$

Известно, что $I = \{z \in R^4 : z_1 = z_2,\ z_3 = z_4\}$-инвариантное множество отображения (6)(см.[5]). Покажем, что система уравнений (6) при $J < 0$ $(0 < \theta < 1)$ и произвольного $k \geq 3$ имеет неединственное решение (z_1, z_2, z_3, z_4) с $z_1 = z_2 = x$, $z_3 = z_4 = y$. При этих условиях из (6) имеем

$$\begin{cases} x = f(y) \\ y = f(x), \end{cases} \quad \text{где } f(x) = \left[\frac{(\theta+1)x+1}{2x+\theta}\right]^k. \tag{7}$$

Пусть $\theta_{cr} \equiv \theta_{cr} = \frac{k-2}{k+1}$. Тогда верна следующая

Теорема 3. *Для модели Поттса при $k \geq 3$, $q=3$, $J<0$ на инвариантном множестве I при $0 < \theta < \theta_{cr}$ существуют не менее двух $G_k^{(2)}-$ периодических (не трансляционно-инвариантных) мер Гиббса.*

Доказательство. Из (7) получим

$$x = g(x) = f(f(x)).$$

Для удобства введем обозначения

$$f(x)=\frac{a^k}{b^k},\quad \text{где}\quad a=(1+\theta)x+1,\quad b=2x+\theta.$$

Мы имеем

$$f'(x)=k(\theta-1)(\theta+2)\cdot\frac{a^{k-1}}{b^{k+1}};$$

$$f''(x)=k(\theta-1)(\theta+2)\cdot\frac{a^{k-2}}{b^{k+2}}\cdot[(k-1)(\theta-1)(\theta+2)-4a];$$

$$g'(x)=f'(f(x))f'(x);$$

$$f'(f(x))=k(\theta-1)(\theta+2)\cdot b^{2k}\cdot\frac{\left((1+\theta)a^k+b^k\right)^{k-1}}{\left(2a^k+\theta b^k\right)^{k+1}}.$$

Из этих формул следует, что функция $f(x)$ убывает при $0<\theta<1$ и $f''(x)=0$ имеет единственное решение. Кроме того, $f(x)=x$ также имеет единственное решение $x=1$, причем $f'(1)=k\frac{\theta-1}{\theta+2}$. Заметим, что $g(x)$ возростает и $x=1$ является решением $g(x)=x$. Это решение неединственно, если $g'(1)=f'(f(1))f'(1)=\left(k\frac{\theta-1}{\theta+2}\right)^2>1$, т.к. в этом случае график функции g при $x>1$ будет лежат выше биссектрисы и функция g ограничена. Таким образом, критическое значение для θ получается из уравнения $\left(k\frac{\theta-1}{\theta+2}\right)^2=1$, которое при $\theta<1$ дает $\theta_{cr}=\frac{k-2}{k+1}$. Из этих рассуждений следует, что при $0<\theta<\theta_{cr}$ уравнение $g(x)=x$ имеет не менее трех решений $x_0^*<x_1^*=1<x_2^*$, т.е. уравнение $g(x)=x$ имеет не менее двух корней, отличных от корней уравнения $f(x)=x$. Значит, при условиях теоремы существуют не менее двух $G_k^{(2)}-$ периодических (не трансляционно-инвариантных) мер Гиббса. Теорема доказана.

Список литературы

[1] Н.Н. Ганиходжаев. *ТМФ*, **85**: 2 (1990), 163–175.

[2] Н.Н. Ганиходжаев. *ДАН РУз*, 6-7 (1992), 4–7.

[3] U.A. Rozikov. *Gibbs measures on Cayley trees*. World Scientific.-2013.

[4] N.N. Ganikhodjaev, U.A. Rozikov. *Lett. Math. Phys.* **75**: 2 (2006), 99-Ц109.

[5] У.А. Розиков, Р.М. Хакимов. *ТМФ*, **175**: 2 (2013), 300–312.

[6] C. Külske, U. A. Rozikov, R. M. Khakimov Description of all translation-invariant (splitting) Gibbs measures for the Potts model on a Cayley tree. Arxiv.1310.6220.

Сведение об авторе

1. Хакимов Рустам Махмудович.

Старший научный сотрудник-соискатель института математики при Национальном Университете Узбекистана.
адрес: Институт математики, ул. Дурмон йули, 29, Ташкент, 100125, Узбекистан.
e-mail: rustam-7102@rambler.ru